

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAUN PEPAYA (*Carica Pepaya*) MENGUNAKAN PELARUT ETANOL TERHADAP BAKTERI *Escherichia coli*

by Tri Puji Lestari Sudarwati

Submission date: 16-Dec-2020 04:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 1476646791

File name: daun_pepaya_2019.doc (140K)

Word count: 2058

Character count: 12395

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAUN PEPAYA (*Carica Pepaya*) MENGGUNAKAN PELARUT ETANOL TERHADAP BAKTERI *Escherichia coli*

Tri Puji Lestari Sudarwati., S.Si., M.Si., Mercyska Suryandari, S. Farm, Apt

Abstrak: Isolasi zat aktif dari herba menimbulkan pandangan baru bahwa tiap herba memiliki zat aktif (satu atau lebih). *Carica papaya L* memiliki zat aktif yang berhasil diisolasi, zat – zat tersebut dapat menggantikan pemakaian herba untuk tujuan pengobatan. *Escherichia coli* merupakan bakteri yang banyak terdapat di usus besar (colon) manusia dan sebagai flora normal colon, sifat *Escherichia coli* dapat menyebabkan infeksi primer pada usus besar sehingga menyebabkan penyakit diare. Sampel yang digunakan adalah Daun Pepaya tua berwarna hijau tua yang diperoleh dari UPT Matera Medika Batu. Dicuci bersih kemudian dikeringkan, kemudian dihaluskan dengan cara diblender. Proses ekstraksi menggunakan metode maserasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 konsentrasi dan kontrol negatif. Metode pengujian antibakteri yang digunakan adalah difusi kertas cakram. Diameter zona hambat pada tiap konsentrasi dianalisis menggunakan statistik menggunakan uji ANOVA. Berdasarkan hasil pengujian dengan melakukan replikasi sebanyak 6 kali pada konsentrasi 20 $\mu\text{g/mL}$ dengan rata – rata 7,25 mm, 40 $\mu\text{g/mL}$ dengan rata – rata 7,43 mm, 60 $\mu\text{g/mL}$ dengan rata – rata 7,7 mm, 80 $\mu\text{g/mL}$ dengan rata – rata 7,8 dan 100 $\mu\text{g/mL}$ dengan rata – rata 7,9 mm dengan kategori sedang. Dapat dikatakan terdapat pengaruh aktivitas antibakteri pada Daun Pepaya (*Carica papaya L*) dengan bakteri *Escherichia coli* maka, semakin tinggi konsentrasi maka daya hambat yang dihasilkan semakin tinggi.

Kata kunci: Daun Pepaya, *Escherichia coli*, maserasi, antibakteri

Pendahuluan

Infeksi merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan sehari – hari. Kasus infeksi disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme yang patogen, yang mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak di dalam jaringan (Waluyo, 2004). Di antara bakteri yang dapat menyebabkan infeksi tersebut adalah *Escherichia coli* (Jawetz et al., 2005). *Escherichia coli* adalah bakteri oportunistis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan *traveler diarrhea*, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. Penyakit – penyakit lain yang disebabkan oleh *Escherichia coli* adalah menginfeksi saluran kemih mulai dari sistitis sampai pielonefritis, pneumonia, meningitis pada bayi dan menginfeksi luka terutama di dalam abdomen (Anonim, 1994).

Dalam pengobatan penyakit infeksi, salah satu masalah serius yang dihadapi kini adalah terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik yang digunakan (Volk and Wheeler, 1993). Dengan berkembangnya populasi bakteri yang resisten, maka antibiotik yang pernah efektif untuk mengobati penyakit – penyakit tertentu kehilangan nilai kemoterapeutiknya. Sejalan dengan hal tersebut, jelas bahwa ada kebutuhan yang terus – menerus untuk

mengembangkan obat – obat baru dan berbeda untuk menggantikan obat – obat yang telah menjadi tidak efektif (Pelczar and Chan, 1988).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Oladimeji dkk. (2007), ekstrak etanol daun pepaya memiliki aktivitas antibakteri secara in vitro terhadap bakteri *Escherichia coli* dengan metode difusi padat cakram berdiameter 6 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kadar 1,5 % dan 3 % ekstrak etanol daun pepaya mampu menghambat pertumbuhan bakteri pada *Escherichia coli* dengan zona hambat masing – masing 10,0 mm dan 11,0 mm. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian tentang zona hambat ekstrak etanol daun pepaya (*Carica papaya L*) terhadap *Escherichia coli* dengan metode maserasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah wawasan kepada masyarakat tentang obat tradisional dan fitoterapi yang saat ini masih berdasarkan data empiris.

METODE PENELITIAN

Bahan dan Alat

Alat yang digunakan untuk membuat ekstrak daun pepaya dengan metode maserasi yaitu alat timbangan, maserator, wadah bejana, beaker glass, gelas ukur, erlenmeyer, batang pengaduk, corong, cawan, penangas air, kertas saring, kain flannel, tabung reaksi, rak tabung, wadah toples gelap. Bahan yang digunakan daun pepaya, pelarut etanol.

Cara kerja

1. Pembuatan ekstrak daun pepaya dengan metode maserasi

Serbuk daun pepaya (*Carica papaya L.*) kering ditimbang sebanyak 100 g. Selanjutnya diekstraksi menggunakan metode maserasi selama 5 hari dengan menggunakan metanol sebagai pelarutnya sebanyak 1 L dalam botol yang terhindar dari sinar matahari. Dalam proses maserasi sekali-kali diaduk sampai semua merata. Setelah 5 hari kemudian di evaporator agar mendapatkan ekstrak kental dari daun pepaya

2. Pengujian Aktivitas Daun Pepaya

Meletakkan 6 kertas cakram dengan diameter 6 mm pada cawan petri steril, kemudian memipet masing – masing konsentrasi ekstrak daun pepaya sebanyak 30 μ L dengan menggunakan mikropipet yellow tip (20 μ L - 200 μ L). Masukkan kedalam kertas cakram pada cawan petri steril. Mengambil kertas cakram yang sudah ditetesi ekstrak daun pepaya dengan menggunakan pinset steril, dan masukkan kedalam media agar yang sudah diisolasi dengan bakteri *Escherichia coli* dengan metode spread plate. Diinkubasi dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu 37°C.

3. Pengolahan data

Pengamatan dilakukan setelah inkubasi 24 jam pada suhu 33°C. Data yang diperoleh :

1. Diameter zona hambat ekstrak daun pepaya yang efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli* disajikan dalam bentuk tabel.
2. Efektifitas ekstrak daun pepaya untuk mengetahui efektivitas zona hambat bakteri *Escherichia coli* ditampilkan secara deskriptif.


Hasil dan Pembahasan

Pengujian pengaruh konsentrasi ekstrak Daun Pepaya (*Carica Papaya L*) menggunakan pelarut etanol terhadap bakteri *Escherichia coli* dilakukan dengan menggunakan metode difusi cakram dengan inkubasi selama 24 jam pada suhu 33°C dan direplikasi sebanyak 6 kali. Hasil uji aktivitas antibakteri dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hasil pengukuran diameter zona hambat bakteri *Escherichia coli* pada konsentrasi tertentu.

Replikasi	Kontrol Negatif (-)	Luas Zona Hambat (mm)				
		20 µg/mL	40 µg/mL	60 µg/mL	80 µg/mL	100 µg/mL
1	-	6,1	8,5	7,9	8,7	8,9
2	-	8,7	6,3	8,8	8,5	8,8
3	-	7,7	8,9	7,9	7,4	8,4
4	-	8,6	7,5	7,4	8,4	7,7
5	-	6,4	6,1	7,7	6,6	6,2
6	-	6,0	7,3	6,5	7,2	7,4
Rata-Rata (mm)	-	7,25	7,43	7,7	7,8	7,9
Kategori	Tidak Aktif	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya L*) pada konsentrasi tertentu terhadap bakteri *Escherichia coli* dengan replikasi sebanyak 6 kali menghasilkan diameter rata – rata zona hambat yang sama terhadap bakteri *Escherichia coli* dengan kategori sedang. Sebagai pembandingan menunjukkan bahwa kontrol negatif tidak terbentuk zona bening yang menandakan tidak adanya aktivitas antibakteri yang bekerja untuk menghambat pertumbuhan bakteri *Escherichia coli*.



Gambar 1 Kurva diameter zona hambat bakteri *Escherichia coli* pada konsentrasi tertentu.

Berdasarkan kurva 1 dapat dilihat dari persamaan regresi nilai $r = 0,9804$ maka dapat dikatakan bahwa kurva tersebut linier. Dengan membandingkan zona hambat dari beberapa konsentrasi tertentu yaitu **semakin tinggi konsentrasi ekstrak maka zona hambat yang terbentuk semakin tinggi**. Menurut Walpole (1995) dapat dilihat dari kenaikan kurva dengan menghitung menggunakan persamaan garis korelasi linier $r = 0,9804$. Suatu korelasi $r = 0,90$ dapat diartikan 90 % pada nilai y (zona hambat) terdapat hubungan yang linier dengan nilai x (konsentrasi). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya L*) menggunakan pelarut etanol terhadap zona hambat bakteri *Escherichia coli* memiliki aktivitas antibakteri dengan kategori sedang pada konsentrasi 20 µg/mL, 40 µg/mL, 60 µg/mL, 80 µg/mL dan 100 µg/mL. Kemudian data dianalisis menggunakan statistik SPSS 19 uji ANOVA *Oneway*.

Tabel 2 Uji ANOVA *Oneway*

ANOVA

	$\sum u_i^2$	df	\bar{U}^2	F	Sig.
Between Groups	291.801	5	58.360	67.891	0.000
Within Groups	25.788	30	.860		
Total	317.590	35			

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai sig. 0,000 nilai tersebut < 0,05 menunjukkan H_1 = diterima, H_0 = ditolak artinya bahwa H_1 terdapat pengaruh konsentrasi terhadap zona hambat. Setelah dilakukan uji ANOVA *Oneway* dilanjutkan dengan uji Duncan untuk menunjukkan perbedaan signifikan pada tiap konsentrasi.

Tabel 3 Uji Duncan

Zona Hambat Bakteri

Duncan^a

K	N	Nilai $\alpha = 0.05$	
		1	2
0	6	0.0000	
20	6		7.2500
40	6		7.4333
60	6		7.7000
80	6		7.8000
100	6		7.9000
Sig.		1.000	0.288

Subset (α) 1 konsentrasi 0 (Kontrol negatif) tidak sama dengan konsentrasi 20 $\mu\text{g/mL}$, 40 $\mu\text{g/mL}$, 60 $\mu\text{g/mL}$, 80 $\mu\text{g/mL}$ dan 100 $\mu\text{g/mL}$. Subset (α) 1 konsentrasi 0 (Kontrol negatif) tidak sama dengan konsentrasi 20 $\mu\text{g/mL}$, 40 $\mu\text{g/mL}$, 60 $\mu\text{g/mL}$, 80 $\mu\text{g/mL}$ dan 100 $\mu\text{g/mL}$ pada subset (α) 2. Pada subset (α) 2 tidak memiliki perbedaan nyata antara konsentrasi 20 $\mu\text{g/mL}$, 40 $\mu\text{g/mL}$, 60 $\mu\text{g/mL}$, 80 $\mu\text{g/mL}$ dan 100 $\mu\text{g/mL}$. Dapat dikatakan adanya beda nyata terkecil dari ke 5 konsentrasi yang dipengaruhi oleh kadar pada masing – masing konsentrasi.

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Metode ini efektif untuk menjaga kualitas senyawa bioaktif yang tidak tahan panas, selain itu cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. Etanol merupakan pelarut universal yang baik untuk ekstraksi semua golongan senyawa metabolit sekunder (Kristanti dkk, 2008). Cairan penyari etanol akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986). Menurut Baskaran et al (2012) senyawa yang dapat diisolasi dari tanaman yang bersifat sebagai antibakteri yaitu alkaloid. Mekanisme kerja alkaloid yang memiliki kemampuan

berinteraksi dengan dinding sel dan DNA (Cowan, 1999). Dari penelitian dilaporkan bahwa alkaloid efektif sebagai antimikroba, karena kemampuan menyusup pada utas ganda DNA dan mempengaruhi enzim topoisomerase dan enzim perbaikan DNA (Cao et al, 2007). Sedangkan pada senyawa fenolik (flavonoid) mekanisme kerja antibakteri bekerja meningkatkan kerja sistem imun karena leukosit sebagai pemakan antigen lebih cepat dihasilkan dan sistem limfoid lebih cepat diaktifkan (Anonim, 2007). Selain itu kompleksasi dari ion besi dengan tanin dapat menjelaskan toksisitas tanin. Mikroorganisme yang tumbuh di bawah kondisi aerobik membutuhkan zat besi untuk berbagai fungsi, termasuk reduksi dari prekursor ribonukleotida DNA. Hal ini disebabkan oleh kapasitas pengikat besi yang kuat oleh tanin.. Respon uji daya hambat daun pepaya (*Carica papaya*) terhadap bakteri *Salmonella thypi* menunjukkan jika pada konsentrasi 20µg/ml sampai 100µg/ml masuk kategori zona hambat sedang dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Salmonella thypi* (Sudarwati, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- ¹³ Adachukwu, I. P., Ann, O. O. and Faith, E. U. 2013. Phytochemical analysis of paw – paw (Carica papaya) leaves. *Int. J. Life Sci. Biothechnol. Pharma Res.*, 2 (3). http://www.ijlbpr.com/jlbpradmin/upload/ijlbpr_51d451cde89e7. Pdf. Diakses tanggal 1 Februari 2015.
- Anonim. 1986. Sediaan Galenik. 2-3. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Anonim. 1994. Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Fakultas Kedokteran. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- ¹² Anonim. 2007. Farmakologi dan Terapi. Ed. 5. Departemen Farmakologi Terapeutik. Fakultas Kedokteran. Universitas Indonesia.
- Anonim. 2014. <http://kesehatantubuh-tips.blogspot.com/2014/05/apa-itu-e-coli.html>.
- Anonim. 18 April 2017. <http://Manfaatsehat.id/manfaat-daun-pepaya/>.
- ³ Davis, W.W., dan T. R. Stout. 1971. Disc Plate Method of Microbiological Antibiotic Assay. *Applied Microbiology*. 22: 659 – 665.
- ²⁰ Depkes RI. 1991. Pedoman Teknis Penyediaan, Pengolahan dan Penyaluran Makanan Rumah Sakit. Depkes RI, Jakarta.
- Harborne, J. B. 1987. Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan. Ed. 2. Hal. 5. 69-76. Diterjemahkan oleh Kosasih Padmawinata dan Iwang Soedira. ITB Press, Bandung.
- Hutapea, J. P., dan S. Hidayat. 1991. Inventaris Tanaman Obat Indonesia. Departemen Kesehatan RI, Balitbang Kesehatan.
- ⁴ Jawetz, E., J. L. Melnick., E. A. Adelberg., G. F. Brooks., J. S. Butel., dan L. N. Ornston. 1995. Mikrobiologi Kedokteran. Edisi. 20. (Alih bahasa : Nugroho & R. F. Maulany). Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Jawetz, E. J., Melnick, et al. 2005. Mikrobiologi Kedokteran. EGC Jawetz, Melnick & Adelberg, Jakarta.
- ⁶ Kamaruddin, M dan Salim. 2003. Pengaruh Pemberian Air Perasan Daun Pepaya Pada Ayam. *Respon Patofisiologi Hepar. J Sain Veteriner*. 20(1) :5-8.
- Kristanti, Alfinda Novi., dkk. 2008. “Buku Ajar Fitokimia”. Airlangga University Press, Surabaya.
- ¹¹ Melliawati, R. 2009. E. Coli dalam kehidupan manusia. *Bio trends/Vol.4/No.1/Th.2009*.
- Oladimeji, O. H., Nia, R., Ndukwe, K., Attih, M. 2007. In Vitro Biological Activities of Carica Papaya. *J of Medicinal Plant*. Edisi I. Vol. 3 : 92-99.

- 9
Pelczar, M.J dan Chan, E. C. S. 1988. Dasar – Dasar Mikrobiologi. Edisi 2. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- 19
Pelczar, J. M. 1998. Dasar – Dasar Mikrobiologi Jilid 2. Alih Bahasa : Ratna Ratna Siri Hadiotomo. UI Press, Jakarta.
- 25
Pratiwi, S. T. 2008. Mikrobiologi Farmasi. Erlangga, Jakarta : 150-171.
- Sharma, V. C dan O. N. Ogbeide. 1991. Renewable Energy Resource For The Production of Alcohol Fuels 7 (10) : 871-873.
- 14
Smith, K. P. F. 1988. Genetic Elements in Escherichia coli. London : Macmillan Molecular biology series.
- Sudarwati, T. P. L. (2018) ‘Aktivitas Antibakteri Daun Pepaya (Carica papaya) Menggunakan Pelarut Etanol terhadap Bakteri Salmonella thypi’, *Journal of Research and Technology*.
- 18
United States Departement of Agriculture. 2001. USDA Nutrient Database for Standart Reference. <http://nal.usda.gov/fnic/foodcomp/Search>. 15 Setember 2008.
- 24
Volk, W. A., M. F. Wheeler. 1993. Mikrobiologi Dasar. Erlangga, Jakarta.
- 17
Walpole, R. E., Raymond H Myers. 1995. “Ilmu Peluang Dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan”. Edisi 4. Penerbit ITB, Bandung.
- Waluyo. 2004. Mikrobiologi Umum : 105-108. Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang.
- 16
Heming, W. K. Dalimartha, S. Wirian, A. S. 1994. Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia. Pustaka Kartini, Jakarta.

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAUN PEPAYA (Carica Pepaya) MENGGUNAKAN PELARUT ETANOL TERHADAP BAKTERI Escherichia coli

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Angga Dehes Kaharap, Christy Mambo, Edward Nangoy. "Uji efek antibakteri ekstrak batang akar kuning (Arcangelisia flava Merr.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli", Jurnal e-Biomedik, 2016
Publication 1%
- 2 repository.uki.ac.id
Internet Source 1%
- 3 cjp.jurnal.stikeskendekiautamakudus.ac.id
Internet Source 1%
- 4 jiip.ub.ac.id
Internet Source 1%
- 5 Earlyna Sinthia Dewi. "POTENSI EKSTRAK ETANOL BUAH TOMAT (Lycopersicum Esculentum) SEBAGAI PENGHAMBAT BAKTERI PENYEBAB PNEUMONIA", Jurnal Agrotek Ummat, 2020
Publication 1%

6	ejurnal.binawakya.or.id Internet Source	1%
7	tr.scribd.com Internet Source	1%
8	rozi-fpk.web.unair.ac.id Internet Source	1%
9	duniajurnalkimia.blogspot.com Internet Source	1%
10	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
11	media.unpad.ac.id Internet Source	1%
12	cepatmenujukses.blogspot.com Internet Source	1%
13	iopscience.iop.org Internet Source	1%
14	Submitted to University College London Student Paper	1%
15	journal.poltekkes-mks.ac.id Internet Source	1%
16	S Mulyati, F A Pramesthy, F Meutia, A Rinaldi, S M Siregar, S Muchtar. " Effects of temperature and duration of drying on the quality of powdered ", IOP Conference Series: Materials	1%

17 Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya 1%

Student Paper

18 Joan Sabaté, Zaida Cordero-MacIntyre, Gina Siapco, Setareh Torabian, Ella Haddad. "Does regular walnut consumption lead to weight gain?", British Journal of Nutrition, 2007 1%

Publication

19 Muhammad Heffiqri Riady, Iis Rostini, Yuli Andriani, Rusky Intan Pratama. "Effectiveness of the Ruku-ruku Leaf Solution (*Ocimum sanctum*) as a Natural Preservative in Indian Mackerel (*Rastrelliger sp.*) during Low-temperature Storage", Asian Food Science Journal, 2019 1%

Publication

20 repository.unika.ac.id 1%

Internet Source

21 ninaambarsario8.blogspot.com 1%

Internet Source

22 garuda.ristekdikti.go.id 1%

Internet Source

23 Submitted to University of Salford 1%

Student Paper

24

Internet Source

<1%

25

simki.unpkediri.ac.id

Internet Source

<1%

26

jurnal.unimed.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAUN PEPAYA (Carica Pepaya) MENGUNAKAN PELARUT ETANOL TERHADAP BAKTERI Escherichia coli

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8
