

Uji Antimikroba Daging Buah (*Carica pubescens*) Matang Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Metode Kirby Bauer Secara In Vitro

By Umarudin

**Uji Antimikroba Daging Buah (*Carica pubescens*) Matang Terhadap Bakteri
Staphylococcus aureus Metode Kirby Bauer Secara In Vitro**

Antimicrobial Test Carica pubescens Fruit Mature in Staphylococcus aureus Bacteria In Vitro with Kirby Bauer Method

Umarudin^{1*}, Floreta Fiska Yuliarni²

^{1,2}Akademi Farmasi Surabaya, Surabaya, Indonesia

*Koresponden: umarsains54@gmail.com

4

Abstrak

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan infeksi kulit seperti bisul atau abses dan jerawat. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan munculnya *S. aureus* yang resisten terhadap antibiotik karena adanya perubahan genetik. Permasalahan yang disebabkan akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat tersebut menimbulkan upaya eksplorasi senyawa antibakteri yang lebih efektif dengan dampak yang minimal. Salah satu tanaman yang bersifat sebagai antibakteri adalah daging buah karika (*Carica pubescens*). Penelitian ini dilakukan secara *true* eksperimental. *S. aureus* diperoleh dari laboratorium Universitas Airlangga dan diidentifikasi berdasarkan sifat biakan, pewarnaan Gram, uji biokimiawi dan uji gula-gula. Isolat selanjutnya diuji antimikroba terhadap ekstrak daging buah *C. pubescens*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh, dapat memfermentasi *plat mannitol salt* agar, sel berbentuk bulat bergerombol, bersifat Gram +, dapat memfermentasi maltosa dan laktosa, dapat menkoagulasi plasma kelinci dan bereaksi positif terhadap uji *clumping* faktor dan uji Voges Proskouer. Pada penelitian ini, hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak daging buah *Carica pubescens* dengan konsentrasi 20%, 40%, dan 60% memiliki daya hambat terhadap *Staphylococcus aureus*. Daya hambat terbesar terdapat pada konsentrasi 60%. Semakin kecil konsentrasi ekstrak *C. pubescens*, semakin kecil daya hambatnya terhadap *S. aureus*.

Kata kunci: *Staphylococcus aureus*, Ekstrak Daging Buah Karika (*Carica pubescens*), antibakteri.

Abstract

Staphylococcus aureus can cause skin infections such as boils or abscesses and acne. Improper use of antibiotics causes the emergence of *S. aureus* that is resistant to antibiotics because of genetic changes. The problems caused by inappropriate use of antibiotics have led to more effective exploration of antibacterial compounds with minimal impact. One of the plants that are as antibacterial is karika fruit (*Carica pubescens*). In this study, it was carried out in a *true* experimental manner. *S. aureus* was isolated from the laboratory Airlangga University and was identified based on culture characteristics, Gram staining, biochemical tests and confectionery tests. The isolates were then tested for antimicrobials against *C. pubescens* fruit extract. The results showed that the isolation of bacteria that grew and could ferment the mannitol salt agar plates, clustered rounded cells, Gram +, fermented maltose and lactose, coagulated rabbit plasma and reacted positively to the clumping factor test and Voges Proskouer test. In this study, test results showed that *Carica pubescens* fruit extracts with concentrations of 20%, 40%, and 60% had inhibitory properties against *Staphylococcus aureus*. The greatest inhibition is found at a concentration of 60%. The smaller the concentration of *C. pubescens* extract, the smaller the inhibitory power against *S. aureus*.

Keywords: *Staphylococcus aureus*, *Carica Pubescens* Fruit Extract, Antibacterial.

PENDAHULUAN

16

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif yang berbentuk kokus. Bakteri tersebut merupakan flora normal pada kulit manusia, tetapi juga merupakan salah satu

penyebab infeksi akibat adanya luka (Brooks, dkk., 2013). Bakteri tersebut tahan terhadap kondisi kering dan toleran pada konsentrasi garam yang relatif tinggi. Karakter tersebut yang menyebabkan *S. aureus* dapat hidup pada kulit manusia atau sel epitel pernafasan manusia dan tidak menyebabkan penyakit yang berbahaya. Namun, menjadi berbahaya apabila masuk ke dalam jaringan kulit atau darah sehingga menyebabkan infeksi (Hogg, 2013; Tortora dkk., 2013). *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit pada kulit seperti jerawat, bisul, atau bisul bermanah serta infeksi saluran pernapasan yang parah (Hogg, 2013). Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menyebabkan munculnya *Staphylococcus aureus* yang resisten terhadap antibiotik, seperti Meticillin-Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA) (Tortora dkk., 2013).

Permasalahan yang disebabkan akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat tersebut menimbulkan upaya eksplorasi senyawa antibakteri yang lebih efektif dengan dampak yang minimal. Salah satu upaya adalah dengan menggunakan tanaman karika (*Carica pubescens*). Bagian yang digunakan diantaranya kulit, daun, biji dari karika (Astuti dan Hadi, 2018; Sugiyarto dkk., 2019). Buah karika berwarna kuning seperti buah pepaya, tetapi dengan ukuran lebih kecil. Buah yang kuning menunjukkan adanya kandungan flavonoid dan betakaroten. Flavonoid adalah senyawa kimia sebagai anti inflamasi, sedangkan betakaroten merupakan salah satu antioksidan untuk mengurangi reaksi radikal bebas dalam jaringan (Magfiroh, 2017). Kandungan karbohidrat buah karika, baik pada daging buah maupun kulit biji dari bagian atas, tengah, bawah (kurang matang hingga semakin matang) polanya menurun kemudian meningkat, sedangkan untuk serat kasar mengalami penurunan (Fitrieningrum dkk., 2013). Daun karika mengandung senyawa alkaloid, fenol, dan flavonoid, sedangkan biji karika mengandung senyawa alkaloid, fenol, dan flavonoid dengan pelarut etil asetat dan mengandung alkaloid dan tannin dengan pelarut n-heksan (Indranila dan Ulfah, 2015; Sugiyarto dkk., 2019).

Penelitian aktivitas antibakteri dengan menggunakan kulit dan biji buah karika yang dilakukan oleh Sugiyarto dkk. (2019) menunjukkan bahwa terjadi zona hambat pada bakteri *E. coli*, *S. aureus*, dan *S. flexneri* dengan menggunakan pelarut etil asetat, sebaliknya tidak menunjukkan aktivitas antibakteri pada bakteri-bakteri tersebut dengan menggunakan pelarut air. Hasil penelitian Astuti dan Hadi (2018), menunjukkan bahwa ekstrak daun karika dengan konsentrasi 100% dapat menghambat bakteri *Vibrio cholerae* dan *Shigella dysenteriae* yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat sebesar 2,6 cm dan 1,4 cm berturut-turut untuk

bakteri *V. cholerae* dan *S. dysenteriae*. Besar daya hambat yang ditunjukkan pada bakteri *V. cholerae* hampir sama dengan antibiotik yang digunakan sebagai kontrol pada penelitian tersebut. Buah karika mengandung senyawa flavonoid, tannin dan terpenoid. Senyawa tersebut bersifat sebagai antibakteri salah satunya melalui mekanisme merusak dinding sel bakteri sehingga bakteri akan lisis. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menggunakan bagian kulit, biji, dan daun karika, tetapi penelitian yang menggunakan daging buah yang muda dan matang pada bakteri *S. aureus* belum diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat dari ekstrak daging buah *Carica pubescens* yang matang terhadap bakteri *S. aureus*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah true eksperimen. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2019. Tempat penelitian di Laboratorium Mikrobiologi Akademi Farmasi Surabaya. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah kompor listrik, erlenmeyer, batang pengaduk, labu ukur, pisau, blender, oven, timbangan digital, gelas ukur, saringan 100 mesh, cawan petri, cawan porselen, pinset, autoklaf, botol vial, swab steril, kertas cakram, tabung reaksi, bunsen, jarum ose, laminar air flow, rotary evaporator, beaker glass. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah karika matang, etanol 96%, antibiotik ampisilin, akuades, media *Nutrient Broth* (NB) dan media *Muller Hinton* (MH) untuk kultur bakteri.

Pembuatan ekstrak

Buah karika matang ditimbang 100 gram, kemudian ditambahkan pelarut etanol 96% sebanyak 1 liter selama 3 hari diaduk sesekali dan dilakukan penyaringan, setelah itu dilakukan evaporasi untuk mendapatkan ekstrak kental karika matang.

Sterilisasi Alat

Alat-alat seperti cawan petri dan tabung reaksi dibungkus dengan aluminium foil dan disterilkan dalam oven dengan suhu 180°C selama 120 menit. Media disterilisasi menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 20 menit. Pinset dan ose disterilisasi dengan cara dibakar menggunakan bunsen.

Pembuatan Konsentrasi Ekstrak dari Larutan Induk

Konsentrasi ekstrak sebesar 20% dibuat dengan cara mengambil 2 ml larutan induk, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, ditambah akuades steril sampai tanda batas, dikocok

sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol vial. Konsentrasi ekstrak sebesar 40% dibuat dengan cara mengambil 4 ml larutan induk, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, ditambah akuades steril sampai tanda batas, dikocok sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol vial. Konsentrasi sebesar 60% dibuat dengan cara mengambil 6 ml larutan induk, dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, ditambah akuades steril sampai tanda batas, dikocok sampai homogen, kemudian dimasukkan ke dalam botol vial.

Perendaman Kertas Cakram Dalam Masing-masing Konsentrasi Ekstrak

Kertas cakram direndam ke dalam masing-masing konsentrasi ekstrak. Perendaman dilakukan selama 20 menit, hingga terserap penuh pada tiap-tiap kertas cakram. Hal yang sama juga dilakukan untuk kontrol negatif dan kontrol positif.

Uji Aktivitas Ekstrak Buah Karika Matang terhadap Pertumbuhan Bakteri *Staphylococcus aureus*.

Swab steril dicelupkan ke dalam biakan bakteri di media NB. Biakan bakteri yang berlebih, dikurangi dengan cara menekan dan memutar *swab* kuat-kuat pada sisi tabung. *Swab* diusapkan ke seluruh permukaan media MH. *Swab* juga diusapkan ke sekeliling pinggiran permukaan agar. Biakan bakteri di cawan petri dibiarkan beberapa menit pada temperatur kamar dalam keadaan tertutup. Kertas cakram yang berisi masing-masing konsentrasi ekstrak diletakkan pada media MH dengan menggunakan pinset steril. Media diletakkan pada inkubator pada suhu 37°C selama 24 jam. Diameter zona hambat diukur dengan jangka sorong setelah inkubasi 24 jam. Zona hambat dicatat dalam satuan mm, kemudian hasil yang didapat diinterpretasikan.

Analisis Data

Data yang didapatkan, dihitung rata-ratanya, kemudian dibuat diagram batang untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan daging buah karika matang (*Carica pubescens*) dalam kondisi segar dan dilakukan pencucian supaya terpisah dari kotoran, kemudian diblender yang bertujuan untuk memperkecil ukuran buah karika serta untuk mempermudah proses maserasi. Menurut Khasanah (2015) menyatakan bahwa buah karika matang yang diblender merupakan suatu usaha untuk memperluas permukaan sehingga zat aktif yang tergantung mudah larut

dengan baik. Pelarut yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan etanol 96%. Menurut Suamiati, dkk. (2016), pelarut etanol 96% bersifat polar sehingga dapat menarik senyawa- senyawa polar seperti flavonoid, saponin dan tanin.


Hasil dari ekstraksi diperoleh rendemen sebesar 10,12%. Ekstrak buah karika matang (*Carica pubescens*), kemudian dievaporasi dengan menggunakan alat *rotary evaporator* pada suhu 40°C. Tujuan dilakukan evaporasi adalah untuk memisahkan ekstrak dengan cairan penyarinya sehingga didapatkan ekstrak yang lebih pekat atau ekstrak yang lebih kental (Harli, 2016). Ekstrak hasil evaporasi tersebut kemudian diuapkan di dalam oven pada suhu 40°C selama 7 hari, hal ini dilakukan untuk menghilangkan pelarut yang masih tersisa (Hanifah, 2015). Pemilihan suhu 40°C dilakukan agar tidak terjadi kerusakan struktur senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam buah karika matang (*Carica pubescens*) akibat pemanasan.

Ekstrak etanol 96% buah karika matang (*Carica pubescens*) yang sudah diperoleh dilakukan uji bebas etanol dengan menambahkan asam asetat dan asam sulfat pekat. Uji bebas etanol tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa ekstrak yang akan diuji telah bebas dari etanol (Wulandari, 2017). Hasil ekstrak etanol 96% buah karika matang (*Carica pubescens*) yang sudah bebas etanol dilakukan pengujian bakteri *Staphylococcus aureus* dengan metode Kirby Bauer secara *in vitro*.

Hasil pengujian ekstrak *C. pubescens* dengan konsentrasi 20%, 40%, dan 60% terhadap bakteri *S. aureus* menunjukkan adanya zona hambat pada semua konsentrasi. Zona hambat adalah daerah bening di sekitar kertas cakram. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat pertumbuhan bakteri di sekitar kertas cakram. Terdapat perbedaan besarnya zona hambat dari masing-masing konsentrasi. Perbedaan besarnya zona hambat pada masing-masing konsentrasi tersebut ditunjukkan pada Tabel 1 dan Gambar 1.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Zona Hambat Ekstrak *C. pubescens* terhadap *S. aureus*.

Bahan uji	Diameter zona hambat (mm)
Ekstrak buah karika matang 20%	8,3
Ekstrak buah karika matang 40%	13,0
Ekstrak buah karika matang 60%	14,7
Kontrol positif	25,0
Kontrol negatif	6,0



Gambar 1. Zona Hambat yang Terbentuk dari Ekstrak *C. pubescens* pada Konsentrasi 20%, 40%, dan 60% terhadap *S. aureus*.


Keterangan

- K (-) : kontrol negatif akuades
 K (+) : kontrol positif ampisilin
 20, 40, dan 60% : ekstrak daging buah karika matang

Ekstrak *C. pubescens* dengan konsentrasi 60% menunjukkan zona hambat paling tinggi, yaitu sebesar 14,7 mm dibandingkan dengan zona hambat yang terbentuk dari ekstrak *C. pubescens* dengan konsentrasi 20% dan 40%, yaitu sebesar 13,0 dan 8,3 mm (Tabel 1. dan Gambar 2.). Pada Gambar 2, terlihat bahwa semakin kecil konsentrasi ekstrak *C. pubescens*, semakin kecil daya hambatnya terhadap *S. aureus*, begitu juga sebaliknya. Semua konsentrasi ekstrak *C. pubescens* lebih kecil apabila dibandingkan dengan kontrol positif, yaitu antibiotik ampisilin. Zona hambat yang terbentuk pada antibiotik ampisilin terhadap *S. aureus* sebesar 25,0 mm. Namun, zona hambat pada antibiotik ampisilin masih terlihat beberapa koloni bakteri yang tumbuh, sedangkan zona hambat pada semua konsentrasi dari ekstrak buah karika tidak terlihat adanya koloni yang tumbuh.

Penelitian yang dilakukan oleh Umami (2018), menyebutkan bahwa biji karika pada konsentrasi 50% memiliki zona hambat terhadap bakteri *Salmonella typhi* sebesar 10 mm, sedangkan pada konsentrasi 12,5 dan 25% tidak terdapat zona hambat. Perbedaan penelitian ini dibandingkan penelitian Umami adalah pada penelitian ini menggunakan daging buah karika matang dan pelarut untuk ekstraksi yang digunakan adalah etanol 96%, bakteri uji *S. aureus*, konsentrasi yang digunakan 20%, 40%, dan 60% serta uji daya hambat menggunakan kertas cakram, sedangkan pada penelitian Umami menggunakan biji buah karika, pelarut untuk ekstraksi adalah etanol 70%, bakteri uji *S. typhi*, konsentrasi yang digunakan 12,5%, 25%, dan 50% serta uji daya hambat menggunakan sumuran. Dari hasil yang didapatkan,

pada penelitian ini dengan konsentrasi 40% sudah dapat menghambat *S. aureus* sebesar 13 mm, sedangkan pada penelitian Umami (2018) pada konsentrasi 50% baru dapat menghambat *S. typhi* sebesar 10 mm. Apabila hanya dengan membandingkan konsentrasi yang digunakan, dapat dikatakan bahwa zona hambat yang terbentuk pada penelitian ini lebih besar jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.



Gambar 2. Perbandingan Besar Zona Hambat yang Terbentuk dari Ekstrak *C. pubescens* terhadap *S. aureus*.

Keterangan

K (-) : kontrol negatif akuades

K (+) : kontrol positif ampisilin

20, 40, dan 60% : ekstrak daging buah karika matang

Pada penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Hadi (2018), menunjukkan bahwa ekstrak daun karika mempunyai kemampuan untuk menghambat bakteri *Vibrio cholerae* dan *Shigella dysenteriae*. Zona hambat ekstrak daun karika terhadap bakteri *V. cholerae* pada konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100% secara berturut-turut adalah 19 mm, 20 mm, 23 mm, dan 26 mm, sedangkan terhadap bakteri *S. dysenteriae* pada konsentrasi 12,5%, 25%, 50%, dan 100% secara berturut-turut adalah 7 mm, 7 mm, 8 mm, dan 14 mm. Pada penelitian tersebut menggunakan daun karika, pelarut etanol 70%, bakteri yang digunakan adalah *V. cholerae* dan *S. dysenteriae*, serta konsentrasi yang digunakan adalah 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu menggunakan kertas cakram untuk uji daya hambat. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan daging buah karika, pelarut etanol 96%, bakteri *S. aureus* dan konsentrasi yang digunakan adalah 20%, 40%, dan 60%. Zona hambat pada penelitian ini dengan konsentrasi 40% (sebesar 13 mm) lebih besar dibandingkan dengan penelitian Astuti dan Hadi pada konsentrasi 50%

(sebesar 8 mm) terhadap bakteri *S. dysenteriae*, tetapi lebih kecil pada konsentrasi 50% (sebesar 23 mm) terhadap bakteri *V. cholerae*.

Menurut Sugiyarto, dkk., (2019), zona hambat yang terbentuk dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah komponen antibakterial yang terdapat dalam ekstrak *C. pubescens*, kemampuan ekstrak untuk berdifusi ke dalam cakram, dan konsentrasi ekstrak. Analisis fitokimia yang dilakukan oleh Sugiyarto dkk., (2019), kulit *C. pubescens* yang diekstrak dengan menggunakan heksan mengandung senyawa alkaloid dan tannin, sedangkan Menurut hasil uji kulit *C. pubescens* yang diekstrak dengan etil asetat mengandung flavonoid, tannin, dan fenol. Hasil penelitian Magfiroh (2017) menyatakan bahwa kandungan buah daging buah karika adalah flavonoid. Hal ini dibuktikan juga pada penelitian yang telah dilakukan positif mengandung flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa golongan dari fenol (Karou *et al.*, 2005). Daya hambat yang diakibatkan melalui mekanisme kerja dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara inaktivasi protein (enzim) pada membran sel.

Menurut Susanti (2008), menyatakan bahwa fenol berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga dapat mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Dimana sebagian besar struktur dinding sel dan membran sitoplasma bakteri mengandung protein dan lemak. Ketidakstabilan pada dinding sel dan membran sitoplasma bakteri menyebabkan fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, pengendalian susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu, yang akan berakibat pada lolosnya makromolekul, dan ion dari sel. Sehingga sel bakteri menjadi kehilangan bentuknya, dan terjadilah lisis yang berakibat pada kematian bakteri *S. aureus*.

Setiap golongan senyawa yang terdapat pada daging buah matang karika memberikan efek yang berbeda dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Adanya perbedaan aktivitas yang terjadi disebabkan oleh metabolit sekunder yang terkandung memiliki efek sinergis yang berbeda tergantung dari sifat dan morfologi dari bakteri tersebut. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibedakan menjadi bakteriostatik dan bakterisidal. Antibakteri bakteriostatik adalah zat yang bekerja menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan antibakteri bakterisida adalah zat yang bekerja mematikan bakteri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daging matang buah karika bersifat bakterisida. Sedangkan kontrol positif bersifat bakteriostatik. Hal ini ditandai disekeliling disk masih ada bakteri sehingga ampisilin pada bakteri *S. aureus* hanya menghambat pertumbuhan

bakteri tersebut. Sedangkan kontrol negative tidak ada zona hambat karena aquadest steril tidak bersifat sebagai antibakteri, namun pada kontrol positif terdapat zona hambat. Hal ini dikarenakan ampisilin yang memiliki spektrum luas. Zona hambat dari perlakuan ampisilin pada penelitian ini adalah sebesar 25 mm yang menunjukkan bahwa ampisilin yang diuji kategori sensitif berdasarkan standart CLSI. Mekanisme kerja dari ampisilin adalah dengan menghambat biosintesis dari mukopeptida dinding sel bakteri saat bakteri bermultiplikasi (Tong *et al.*, 2015). Ampisilin, memiliki senyawa-senyawa kimia yang lebih kuat dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dibandingkan dengan ekstrak daging matang buah karika. Berdasarkan uraian diatas pada penelitian ini pengulangan dalam berbagai konsentrasi menunjukkan aktivitas antibakteri dengan terbentuknya zona hambat. Hal ini membuktikan hipotesis dalam penelitian ini bahwa ekstrak etanol daging matang buah *C. pubescens*, terhadap *Staphylococcus aureus* dengan metode Kirby-Bauer.

KESIMPULAN

Ekstrak daging matang buah *Carica pubescens* dengan konsentrasi 20%, 40%, dan 60% memiliki daya hambat terhadap *Staphylococcus aureus*. Daya hambat terbesar terdapat pada konsentrasi 60%. Semakin kecil konsentrasi ekstrak daging matang buah *C. pubescens*, semakin kecil daya hambatnya terhadap *S. aureus*, begitu juga sebaliknya.

Uji Antimikroba Daging Buah (*Carica pubescens*) Matang Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Metode Kirby Bauer Secara In Vitro

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

- 1** ejournal.uki.ac.id
Internet 21 words — 1%
- 2** angelynwasugai1.blogspot.com
Internet 20 words — 1%
- 3** Syayidah Sopiah, Utmi Arma, Busman Busman. "AKTIVITAS ANTIJAMUR EKSTRAK BUAH PINANG TUA (*Areca catechu* L) TERHADAP JAMUR *Candida albicans* PADA PASIEN KANDIDIASIS RONGGA MULUT", B-Dent, Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, 2019
Crossref 18 words — 1%
- 4** dieraskincare.com
Internet 17 words — 1%
- 5** repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet 17 words — 1%
- 6** Iis Salihat, Orryani Lambui, Ramadanil Pitopang. "UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK DAUN CENGKEH (*Syzygium aromaticum* (L.) Merr. & L. M Perry.) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI *Shigella dysenteriae*", Biocelebes, 2020
Crossref 16 words — 1%

-
- 7 eprints.uns.ac.id Internet 16 words — 1%
-
- 8 jurnal.polinela.ac.id Internet 16 words — 1%
-
- 9 Bayu K. Rante, Youla A. Assa, Paulina N. Gunawan. "Uji daya hambat getah kulit buah pisang goroho (*Musa acuminata* L.) terhadap pertumbuhan *Staphylococcus aureus*", e-GIGI, 2017
Crossref 11 words — < 1%
-
- 10 Fransisca Macpal, Adithya Yudistira, Defny S. Wewenggang. "UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA DARI JAMUR LAUT YANG BERASOSIASI DENGAN ORGANISME LAUT SPONS *Callyspongia aerizusa*", PHARMACON, 2019
Crossref 11 words — < 1%
-
- 11 ojs.umsida.ac.id Internet 11 words — < 1%
-
- 12 www.slideshare.net Internet 11 words — < 1%
-
- 13 Esterlina Aldora Puluh, Hosea Jaya Edy, Jainer Pasca Siampa. "Uji Antibakteri Sediaan Masker Peel Off Ekstrak Etanol Daun Alpukat (*Persea americana* Mill.) terhadap Bakteri *Staphylococcus epidermidis* sebagai Antijerawat", Jurnal MIPA, 2019
Crossref 10 words — < 1%
-
- 14 Fahri Bian, Febby E.F. Kandou, Marhaenus J. Rumondor. "DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL *Schismatoglottis* sp. TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*", JURNAL ILMIAH SAINS, 2015
Crossref 10 words — < 1%

15 Nisaummahmudah Nisaummahmudah, Kornialia Kornialia, Nurhamidah Nurhamidah. "PENGARUH EKSTRAK KUBIS (*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.) DALAM PEMBENTUKAN ZONA HAMBAT TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI *Streptococcus mutans* PADA KARIES (In Vitro)", B-Dent, Jurnal Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah, 2019

10 words — < 1%

Crossref

16 Nurul Hidayah, Choirul Huda, Dara Pranidya Tilarso. "UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI DAUN BIDURI (*Calotropis gigantea*) TERHADAP *Staphylococcus aureus*", JOPS (Journal Of Pharmacy and Science), 2021

10 words — < 1%

Crossref

17 Ratih Dewi Dwiyantri, Nurlailah Nurlailah, Indah Kurnia Widiningsih. "Efektivitas Air Rebusan Daun Binahong (*Anredera cordifolia*) Terhadap Pertumbuhan *Salmonella typhi*", Medical Laboratory Technology Journal, 2015

10 words — < 1%

Crossref

18 Rustam Musta, Laily Nurliana. "Studi Kinetika Efektifitas Minyak Daun Cengkeh (*Syzygium aromaticum*) Sebagai Antifungi *Candida albicans*", Indo. J. Chem. Res., 2019

10 words — < 1%

Crossref

19 Siti Hartini, Eliya Mursyida. "EFEKTIVITAS PEMBERIAN EKSTRAK DAUN PEPAYA (*Carica papaya* L) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI *Escherichia coli* dan *Shigella dysenteriae*", Klinikal Sains : Jurnal Analisis Kesehatan, 2019

10 words — < 1%

Crossref

20 as-wait.icu

Internet

10 words — < 1%

21 ebookinga.com

10 words — < 1%

22 ejurnal.uij.ac.id
Internet

10 words — < 1%

23 David Albert Pangemanan, Edi Suryanto, Paulina V. Y. Yamlean. "SKRINNING FITOKIMIA, UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DAN TABIR SURYA PADA TANAMAN JAGUNG (*Zea mays* L.)", PHARMACON, 2020
Crossref

9 words — < 1%

24 Dewi Sartika, Sutikno Sutikno, Neti Yuliana, Syarifah R M. "IDENTIFIKASI SENYAWA ANTIMIKROBA ALAMI PANGAN PADA EKSTRAK KULIT BUAH NAGA MERAH DENGAN MENGGUNAKAN GC-MS [Identification of Food Natural Antimicrobe Compound from Red Dragon Fruit Peel Extract by GC-MS]", Jurnal Teknologi & Industri Hasil Pertanian, 2019
Crossref

9 words — < 1%

25 Febrian Ramadan, Robert Bara, Fitje Losung, Remy Mangindaan, Veibe Warouw, Silvester Pratasik. "Substansi anti bakteri dari jamur endofit pada mangrove *Avicennia marina*", JURNAL PESISIR DAN LAUT TROPIS, 2018
Crossref

9 words — < 1%

26 Marniati Salim. "STUDY AND CHARACTERIZATION GROWTH OF FOUR MICROALGAE SPECIES AND TEST ANTIMICROBIAL ACTIVITY", Jurnal Zarah, 2018
Crossref

9 words — < 1%

27 Toar Waraney Senduk, Lita A. D. Y. Montolalu, Verly Dotulong. "The rendement of boiled water extract of mature leaves of mangrove *Sonneratia alba*", JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN TROPIS, 2020
Crossref

9 words — < 1%

- 28 journal.student.uny.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 29 jurnal.poltekeskupang.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 30 jurnal.yudharta.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 31 repositori.usu.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 32 repository.ipb.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 33 repository.unej.ac.id
Internet 9 words — < 1%
-
- 34 Amalia Desty Nofita. "UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLIK BAWANG MERAH (*Allium cepa* L.) TERHADAP BAKTERI *Staphylococcus aureus* DALAM MEDIA MUELLER HINTON AGAR (MHA)", *Media Informasi*, 2021
Crossref 8 words — < 1%
-
- 35 Ervianingsih Ervianingsih Ervianingsih, Izal Zahran, Hurria Hurria, Novita Imeldha. "Uji Efektivitas Ekstrak Lidah Mertua (*Sansevieria trifasciata*) untuk Menyembuhkan Luka Bakar pada Hewan Coba Kelinci (*Oryctolagus cuniculus*)", *Jurnal Farmasi Indonesia*, 2020
Crossref 8 words — < 1%
-
- 36 Melia Soniman. "EFEKTIVITAS SENYAWA AKTIF KOMBINASI KENCUR *KAEMPFERIA GALANGA* DAN ILALANG *IMPERATA CYLINDRICA* SECARA IN VITRO TERHADAP BAKTERI GRAM POSITIF DAN BAKTERI GRAM NEGATIF", *Journal of Aquatropica Asia*, 2022 8 words — < 1%

37 Musdalifah Musdalifah, Akhmad Khumaidi, I Nengah Suwastika. "Uji Daya Hambat Dan Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Macaranga tanarius (L.) Mull. Arg Sebagai Antibakteri Salmonella typhi", *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 2017

Crossref

38 Ni nyoman Rupiniasih, Indriani, Syamsuddin, Abdul Rahman Razak. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI FRAKSI n-HEKSAN, KLOROFORM, ETIL ASETAT BUNGA KAMBOJA (Plumeria alba) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN Salmonella typhi", *KOVALEN: Jurnal Riset Kimia*, 2019

Crossref

39 Rahmawati Rahmawati, Masdiana Tahir, A.Hesti Wulandasari Amir. "KANDUNGAN SENYAWA KIMIA DAN AKTIVITAS FARMAKOLOGI TANAMAN MATOA (Pometia Pinnata J.R. Forster & J.G. Forster)", *Jurnal Ilmiah As-Syifaa*, 2022

Crossref

40 ejournal-s1.undip.ac.id

Internet

41 ejournal.umm.ac.id

Internet

42 lib.unnes.ac.id

Internet

43 www.scilit.net

Internet

44 Rafika Sari, Lia Deslianri, Pratiwi Apridamayanti. "Skrining Aktivitas Antibakteri Bakteriosin dari

45 Yanti Y. Warbung. "Daya Hambat Ekstrak Spons Laut Callyspongia sp terhadap Pertubuhan Bakteri Staphylococcus aureus", e-GIGI, 2013 7 words — < 1%

Crossref

46 Yuniartha Dwi Suputri, Agus Dwi Ananto, Yayuk Andayani. "Analisis Kualitatif Kandungan Fenolik dalam Fraksi Etil Asetat dan Fraksi Metanol dari Ekstrak Kulit Jagung (Zea mays L.)", Lumbung Farmasi: Jurnal Ilmu Kefarmasian, 2021 7 words — < 1%

Crossref

47 ejurnal.setiabudi.ac.id 7 words — < 1%

Internet

48 Serly D. S. Toding, Herny E. I. Simbala, Deby A. Mpila. "UJI DAYA HAMBAT EKSTRAK ETANOL DAUN KACAPIRING (Gardenia augusta) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus, Escherichia coli DAN Salmonella thypi", PHARMACON, 2020 6 words — < 1%

Crossref

49 Tri Puji Lestari Sudarwati. "Aktivitas Antibakteri Daun Pepaya (Carica Papaya) Menggunakan Pelarut Etanol Terhadap Bakteri Bacillus subtilis", Journal of Pharmacy and Science, 2018 6 words — < 1%

Crossref

50 lhimasnet2.blogspot.com 6 words — < 1%

Internet

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF